

# ***La nymphoplastie de réduction***

Cette hypertrophie des petites lèvres peut être source de gêne de type mécanique avec douleurs pendant les rapports sexuels, lors de la pratique de sports ou lors du port de vêtements serrés. Mais elle est surtout responsable de gêne psychologique avec parfois un véritable complexe depuis l'adolescence troublant la vie amoureuse et sexuelle.

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale courte autorisant une sortie le jour même (ambulatoire).

## ***Suites opératoires***

Les fils sont résorbables et disparaissent tous seuls en 15 jours. Des soins quotidiens sont à réaliser une fois par jour pendant 10 jours.

Il peut exister quelques douleurs mais surtout une gêne dans les jours qui suivent l'opération. Un arrêt de travail de quelques jours est conseillé.

Les rapports sexuels ainsi que le sport peuvent être repris un mois après l'intervention.

Une grossesse ne doit pas être envisagée dans les 6 mois.

## ***Complications potentielles***

- Désunion
- Infection



Source : Syndicat National de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | [www.sncpre.org](http://www.sncpre.org)

## ***Cabinets médicaux - Dr Jean De Wan***

**GEMBLoux (Pégase)**

Rue des Fabriques 6  
Secrétariat : 081 60 06 00

**CHARLEROI**

Rue Dagnelies 5  
Secrétariat : 071 32 97 42

**WATERLOO**

Rue du Gaz 1  
Secrétariat : 02 354 05 52

**Dr Jean De Wan**

Chirurgie & médecine esthétique

